



Colegiul Medicilor Stomatologi ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, Sector 1, București

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

Publicată în: [M. Of. nr. 292 din 3 aprilie 2025](#)

Data intrării în vigoare: **3 aprilie 2025**

DECIZIE

privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul stomatologic*)

**) Forma consolidată a Deciziei nr. 2/2CN din 20 martie 2025, prin includerea modificărilor și completărilor aduse prin Rectificarea nr. 2/2CN din 20 martie 2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 437 din 13 mai 2025.*

Având în vedere prevederile art. 512 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1. — (1) În vederea asigurării calității actului medico-dentar, la nivelul fiecărui cabinet stomatologic se va asigura o trusă de urgență.

(2) Conținutul minim al trusei de urgență este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 11/2CN/2024 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul stomatologic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 522 din 5 iunie 2024.

Art. 3. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,

Florin-Dan-Cezar Lăzărescu

București, 20 martie 2025.

Nr. 2/ 2CN/ 2025



Colegiul Medicilor Stomatologi
ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, Sector 1, București

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

ANEXĂ

CONȚINUTUL MINIM

al trusei de urgență pentru cabinetul stomatologic

I. Aparatură și materiale obligatorii:

1.	Tensiometru	1 buc.
2.	Feșe 10x10 cm	1 rolă
3.	Bandă adezivă 5x5 cm	1 rolă
4.	Seringi 5 ml/ 10 ml sterile	5 buc.

II. Aparatură facultativă:

- balon de resuscitare
- pipă orofaringiană
- pulsoximetru
- termometru
- defibrilator
- glucometru
- branule
- garou

III. Medicamente obligatorii:

Nr	DCI (denumire comună internațională)	Forma farmaceutică	Cantitate	Observații	Prospect disponibil https://nomenclator.anm.ro/medicamente?order=dc&direction=asc
1	POVIDONUM IODINATUM	Soluție cutanată 100mg/ml	1 flacon		https://www.anm.ro/_PRO/pro_688_01.05.08.pdf
2.	Ser fiziologic	500 ml	1 buc		https://www.anm.ro/_PRO/PRO_5978_22.11.13.pdf



Colegiul Medicilor Stomatologi

ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, Sector 1, București

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

3.	NITRO GLYCERINUM	Spray sublingual 0,4mg/doză	1 flacon	Se administrează în criză de angina pectorală, astm cardiac. La debutul unei crize se administrează 1 puf sub limbă, apoi se închide gura înainte de a respira normal. Dacă simptomele persistă, administrarea se poate repeta, fără a depăși 3 pufuri la interval de 5 minute între doze.	https://www.anm.ro/ / PRO/PRO_12439_25.09.19.pdf
		sau Comprimat. sublinguale 0,5mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. sublingual în criză de angina pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TAs >100 mg Hg. Dacă durerea cardiacă (criza anginoasă) nu cedează, doza poate fi repetată.	https://www.anm.ro/ / PRO/PRO_9419_27.10.16.pdf
4.	NIFEDIPINUM	30 mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. pentru reducerea tensiunii arteriale.	https://www.anm.ro/ / PRO/PRO_11912_11.06.19.pdf
5.	ACIDUM ACETYSALICYLICUM	Comprimat. gastrorezistente 100mg sau 75mg	5 buc.	Antitrombotice, antiagregante plachetare, administrate conform prospectului, pentru a reduce riscul de formare a cheagurilor de sânge, împiedicând astfel apariția ulterioară a: infarctului miocardic, accidentelor vasculare cerebrale, problemelor cardiovasculare la pacienții diagnosticați cu angină pectorală stabilă sau instabilă.	https://www.anm.ro/ / PRO/PRO_15003_19.05.23.pdf https://www.anm.ro/ / PRO/PRO_15002_19.05.23.pdf
6.	CAPTOPRILUM sau FUROSEMIDUM	Comprimat. 25mg sau 50mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. pentru reducerea tensiunii arteriale.	https://www.anm.ro/ / PRO/PRO_11274_27.12.18.pdf https://www.anm.ro/ / PRO/PRO_11275_27.12.18.pdf
		Comprimat. 40 mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. pentru reducerea tensiunii arteriale (La vârstnici, furosemida se administrează cu prudență deoarece acestia sunt sensibili	https://www.anm.ro/ / PRO/PRO_13808_22.03.21.pdf https://www.anm.ro/ / PRO/PRO_13808_22.03.21.pdf



Colegiul Medicilor Stomatologi

ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, Sector 1, București

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

	sau			la efectele diuretice și hipotensive ale furosemidei. Pacienții vârstnici prezintă un risc mai mare de apariție a colapsului sau a tromboemboliei și au funcțiile renale modificate, ceea ce impune ajustarea dozei).	O/PRO_6602_30.06.14.pdf
	METOPROLOLUM	Comprimat/ Comprimat cu eliberare prelungită. 50mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. pentru reducerea tensiunii arteriale	https://www.anm.ro/ / PR O/PRO_12449_25.09.19.pdf https://www.anm.ro/ / PR O/PRO_7136_26.11.14.pdf
7.	EPINEPHRINUM	Soluție injectabilă în stilou preumplut 150 µg 300 µg	1 buc. 1 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic, injectându-se o doză i.m.; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar.	https://www.anm.ro/ / PR O/PRO_11529_20.03.19.pdf https://www.anm.ro/ / PR O/PRO_11530_20.03.19.pdf
8.	HYDROCORTISONUM	Soluție injectabilă 19,6mg/5ml	5 buc.	Se administrează i.v. în stări de șoc, edem laringian, insuficiență respiratorie acută, stare de rău astmatic, edem pulmonar toxic, edem Quincke, comă, encefalită acută, meningită acută, insuficiență corticosuprarenaliană acută.	https://www.anm.ro/ / PR O/PRO_13608_21.12.20.pdf
		sau pulbere și solvent pt. soluție injectabilă/perfuzabilă 100mg	5 buc.	Poate fi administrat i.v. (cu o seringă sau perfuzie) sau i.m. (cu o seringă).	https://www.anm.ro/ / P RO/PRO_15571_07.08.24.pdf
9.	LEVOCETIRIZINUM	Comprimat filmat 5mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute.	https://www.anm.ro/ / P RO/pro_2074_20.10.09.pdf
	Sau LORATADINUM	Comprimat 10mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute	https://www.anm.ro/ / P RO/PRO_11021_12.10.18.p df
	sau	sau Sirop 1mg/ml	1 sticlă	Se administrează 10 ml în cazul reacțiilor alergice acute	https://www.anm.ro/ / P RO/PRO_11020_12.10.18. pdf



Colegiul Medicilor Stomatologi

ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, Sector 1, București

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

	DESLORATA DINUM sau CETIRIZINUM	Comprimat filmate 5mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute	https://ec.europa.eu/health/docu ments/community- register/html/reg_hum_act.htm? sort=a
		Picături orale soluție 10mg/ml	1 sticlă	Se administrează 5 mg (10 picături) în cazul reacțiilor alergice acute	<a href="https://www.anm.ro/ / PRO/
pro_5076_19.10.12.pdf">https://www.anm.ro/ / PRO/ pro_5076_19.10.12.pdf
10.	SALBUTAMOL UM	Suspensie de inhalat presurizată 100µg/doza	1 buc.	Se administrează 1-2 pufuri în caz de criză de astm bronșic	<a href="https://www.anm.ro/ / PR
O/pro_675_24.04.08.pdf">https://www.anm.ro/ / PR O/pro_675_24.04.08.pdf <a href="https://www.anm.ro/ / PR
O/PRO_9542_21.12.16.pdf">https://www.anm.ro/ / PR O/PRO_9542_21.12.16.pdf
11.	GLUCOSUM	Soluție injectabilă 3,3 g/10ml	3 fiole	Se administrează în caz de hipoglicemie, în injecții intravenoase lente, în doze care depind de necesitățile individuale ale pacientului (stare clinică, greutate, alimentație, asocieri terapeutice) și de glicemie. Doza nu trebuie să depășească 500 – 800 mg glucoza/kg corp/oră și 500 ml/24 ore.	<a href="https://www.anm.ro/ / PR
O/PRO_13733_25.02.21.pdf">https://www.anm.ro/ / PR O/PRO_13733_25.02.21.pdf
12.	CARBAZOCHRO MI SALICYLAS	Soluție injectabilă/ perfuzabilă 1,5mg/5ml	5 fiole	Se administrează o fiolă i.m. în caz de hemoragie	<a href="https://www.anm.ro/ / PR
O/PRO_13065_20.03.20.pdf">https://www.anm.ro/ / PR O/PRO_13065_20.03.20.pdf
	sau ETAMSYLA TUM	Soluție injectabilă 250mg/2ml	5 fiole		<a href="https://www.anm.ro/ / PR
O/PRO_12401_30.08.19.pdf">https://www.anm.ro/ / PR O/PRO_12401_30.08.19.pdf
	sau PHYTOMENA DIONUM	Soluție injectabilă 10mg/ml	5 fiole		<a href="https://www.anm.ro/ / PR
O/PRO_9981_22.05.17.pdf">https://www.anm.ro/ / PR O/PRO_9981_22.05.17.pdf
13.	KETOROLACU M TROMETHAMI N (KETOROL) sau METAMIZOLU M NATRIUM	Comprimat filmate 10mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. oral ca analgezic	<a href="https://www.anm.ro/ / PR
O/PRO_7608_30.04.15.pdf">https://www.anm.ro/ / PR O/PRO_7608_30.04.15.pdf
		Comprimat 500mg	5 buc.		<a href="https://www.anm.ro/ / PR
O/PRO_14462_24.05.22.pdf">https://www.anm.ro/ / PR O/PRO_14462_24.05.22.pdf
14.		Comprimat 500mg	5 buc.	Ca măsură de precauție, este de preferat să se evite utilizarea	<a href="https://www.anm.ro/ / PR
O/PRO_12528_30.09.19.pdf">https://www.anm.ro/ / PR O/PRO_12528_30.09.19.pdf



Colegiul Medicilor Stomatologi

ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, Sector 1, București

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

	PARACETAMOLUM			paracetamolului în timpul sarcinii, cu precădere în primele 3 luni și după luna a 5-a. Paracetamolul se poate administra cu precauție în timpul alăptării.	
	sau IBUPROFENUM				
	sau METAMIZOLU M NATRIUM	Comprimat filmate/ Drajeuri/ Capsule moi 200 mg	5 buc	Nu este recomandat în primele 3 luni de sarcină. Este contraindicat în timpul ultimelor 4 luni de sarcină. Se recomandă, ca o măsură de precauție, să se evite administrarea la mamele care alăptează.	https://www.anm.ro/ / PRO/PRO_7161_27.11.14.pdf
		Comprimat/ Comprimat filmate 500mg	5 buc	Dozele unice de metamizol pot fi acceptate între luna a 3-a și a 6-a, după ce beneficiile și riscurile utilizării metamizolului au fost evaluate cu atenție. Nu se administrează metamizol în ultimele 3 luni de sarcină din cauza unui risc crescut de complicații pentru mamă și făt. În perioada alăptării, în cazul unei singure administrări de metamizol, mamele sunt sfătuite să colecteze și să arunce laptele matern timp de 48 de ore după administrarea dozei.	https://www.anm.ro/ / PRO/PRO_10965_11.09.18.pdf

IV. Medicamente facultative:

Nr	DCI (denumire comună internățională)	Forma farmaceutică	Cantitate	Observații	Prospect disponibil
1.	EPINEPHRINUM	Soluție injectabilă 1 mg/ml	3 fiole	Se administrează în cazul șocului anafilactic 0,3 mg adrenalină (0,3 ml soluție injectabilă nediluată) sc/im; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar (până la TAS > 90 mm Hg).	https://www.anm.ro/ / PRO/PRO_10171_04.09.17.pdf



Colegiul Medicilor Stomatologi

ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, Sector 1, București

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

2.	EPHEDRINI HYDROCHLORI DUM	Soluție injectabilă 50 mg/ml	5 fiole	Hipotensiune arterială: Efedrina se administrează în doza recomandată de 10-50 mg intramuscular sau subcutanat sau 5-25 mg lent intravenos repetând la nevoie până la 50 mg intramuscular sau 25 mg intravenos Doza zilnică administrată parenteral la adulți nu trebuie să depășească 150 mg.	https://www.anm.ro/_/ PRO/PRO_12497_30.09.19.pdf
3.	ATROPINUM	Soluție injectabilă 1 mg/ml	5 fiole	Bloc atrio-ventricular. Infarct miocardic acut, pentru prevenirea și tratamentul blocului atrioventricular și al bradicardiei sinusale. Resuscitare cardiopulmonară, pentru tratamentul bradicardiei sinusale. Bolus 0,1mg la 10 kg.	https://www.anm.ro/_/ PRO/PRO_6061_23.12.13.pdf
4.	DIAZEPAMUM	Soluție injectabilă 5mg/ml	3 fiole	Se administrează 1 fiolă i.m. în caz de criza convulsivă	https://www.anm.ro/_/ PRO/PRO_9509_13.12.16.pdf
5.	DIPHENHYDRA MINUM	Soluție injectabilă Concentratia 30mg/2ml	3 fiole	Se administrează i.m. profund o fiolă în cazul reacțiilor alergice acute	https://www.anm.ro/_/PRO/P RO_13919_27.05.21.pdf
6.	OXIGENUM	Gaz medicinal comprimat 100% (v/v)			https://www.anm.ro/_/PRO/P RO_14798_28.11.22.pdf
7.	AMOXICILLINU M *	Comprimate 500mg	10 buc.	Se administrează 2g oral pentru antibioprofilaxie	https://www.anm.ro/_/PRO/pr o_5474_27.03.13.pdf
	Sau CLARITHROMY CINUM	Comprimate 500mg	10 buc.	Se administrează 1 cpr. oral pentru antibioprofilaxie	https://www.anm.ro/_/ PRO/PRO_10696_13.04.18.pdf
* NU se administrează pacienților alergici la peniciline !					