



# Colegiul Medicilor Stomatologi

R O M Â N I A

Str. Lainici nr. 9, sector 1

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

## PROPUNERE TRUSĂ DE URGENȚĂ PENTRU CABINETUL STOMATOLOGIC

### I. Aparatură și materiale obligatorii

1.	Tensiometru	1 buc.
2.	Feșe 10x10 cm	3 role
3.	Bandă adezivă 5x5 cm	2 role
4.	Soluție polividon-iodat (BETADINA, IODINĂ, IODOSEPT, POLIODINE) sau clorhexidină (HIBISCRUB, HIBITANE, CLORHEXIN, DESMANOL) pentru tegumente	1 flacon
5.	Seringi 5 ml/ 10 ml sterile	5 buc.

### II. Aparatură facultativă:

- butelie de oxigen cu reductor
- balon de resuscitare
- pipă orofaringiană
- pulsoximetru
- branule
- garou

### III. Medicamente obligatorii

Nr.	DCI (denumirile comerciale sunt listate în paranteză)	Forma farmaceutică	Cantitate	Observații
1.	Nitroglicerina (Ex. NITROMINT)	Cpr. 2,6 mg	1 cutie (50 cpr.)	Se administrează 1 cpr sublingual în criză de angina pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TAs >100 mg Hg; se poate repeta administrarea la intervale de 5 min (până la 3-4 cpr)
		sau  Aerosol 0,4 mg/doză	1 flacon (10g)	Se administrează 2 pufuri sublingual în criză de angina pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu Tas >100mg Hg; se poate repeta la 5 min.



## Colegiul Medicilor Stomatologi

ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, sector 1

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

2.	Nifedipină (ADALAT, CORDIPIN, CORINFAR, NIFIDIPIN, NIFADIL, NIFELAT)	Cpr. 10 mg	1 cutie (10 cpr.)	Se administrează 1 cpr. pentru reducerea TA,
3.	Acid acetilsalicilic (ASPIRINĂ)	Cpr. 500 mg	10 buc.	Se administrează 1 cps. mestecat în cazul suspiciunii de infarct acut miocardic
4.	Enalapril (ENAP)	Cpr. 5 mg 10 mg	10 buc.	Se administrează 1 cps. pentru reducerea TA; la nevoie se mai poate administra 1 cpr.
5.	sau Furosemid (FUROSEMID)	Cpr. 40 mg	10 buc.	Se administrează 1 cps. pentru reducerea TA
6.	sau METOPROLOL (BETALOC)	Cpr. 50 mg	10 buc.	Se administrează 1 cps. pentru reducerea TA
7.	Adrenalină 1:1000 (EPIPEN, EPIPEN 300)	stick autoinjector 0,3 mg (adulți)	1 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic, injectându-se o doză i.m.; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar
	Adrenalină 1:2000 (EPIPEN JUNIOR, EPIPEN 150) *	stick autoinjector 0,15 mg (copii>30kg)	1 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic, injectându-se o doză i.m.; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar
* medicament obligatoriu doar în trusa de urgență din dotarea cabinetelor școlare de medicină dentară, conform <i>Ordinului comun al MEN/MS nr. 3764/2018</i>				
8.	Hidrocortizon Hemisuccinat  (FLEBOCORTID, HIDROCORTIZONE, HIDROCORTIZONE NATRIU SUCCINAT)	flacon 100mg  sau  fiole 25 mg	10x100mg    40x25mg	Se administrează i.m. în cazul reacțiilor alergice acute, al crizei de astm bronșic sau al crizei Addisoniene



## Colegiul Medicilor Stomatologi ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, sector 1

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

9.	Levocetirizina (XYZAL)	5 mg	10 cpr.	Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute
	sau Loratadină (CLARITINE)	Cpr. 10 mg	10 buc.	Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute
	sau Desloratadină (AERIUS)	Cpr. 5 mg	10 buc.	Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute
	sau Cetirizină (ZYRTEC)	Soluție 10mg/ml	1 sticlă	Se administrează 5 mg (10 picături) în cazul reacțiilor alergice acute
10.	Salbutamol (BUVENTOL, SALBUVENT, VENTOLIN)	Spray 100mg/doză	1 buc.	Se administrează 1-2 pufuri în caz de criză de astm bronșic
11.	Glucoză 5%	flacon 500 ml	1 buc.	Se administrează 5-10 ml oral în caz de hipoglicemie
12.	Adrenostazin	fiole 1,5mg/5ml	5 buc.	Se administrează o fiolă i.m., în caz de hemoragie
	sau Etamsilat	fiole 250mg/2ml	5 buc.	
	sau Fitomenadionă	fiole 10mg/ml	5 buc.	
13.	Ketorolac (KETOROL, KETRODOL, TORADOL)	Cpr. 10 mg	10 buc.	Se administrează 1 cpr. oral ca analgezic
	sau Metamizol (ALGOCALMIN, ANALGIN)	Cpr. 500 mg	10 buc.	
14.	Drotaverină (NO-SPA)	Cpr. 40 mg	10 buc.	Se administrează 1 cpr. oral ca analgezic la pacienta însărcinată
15.	Amoxicilină (OSPAMOX, DUOMOX, E- MOX, EPHAMOX, MOXILEN)**	Cpr. 40 mg	10 buc.	Se administrează 2 g oral pentru antibioprolaxie



## Colegiul Medicilor Stomatologi

ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, sector 1

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

sau	Clindamicină (DALACIN C, CLINDAMICIN, KLINDA, LANACINE)	Cpr. 600 mg	10 buc.	Se administrează 1 cpr. oral pentru antibioprofilaxie
<b>** NU se administrează pacienților alergici la peniciline !!</b>				

#### IV. Medicamente facultative:

1.	Adrenalină 1:1000	fiole 1mg/1ml	5 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic 0,3 ml soluție injectabilă nediluată s.c. / intralingual; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar (până la TAS > 90 mm Hg)
2.	Diazepam	fiole 10 mg/2ml	5 buc.	Se administrează 1 fiolă i.m. în caz de criza convulsivă
3.	Prometazină (ROMERGAN)	fiole 50mg/2ml	5 buc.	Se administrează i.m. profund o fiolă în cazul reacțiilor alergice acute
4.	Alprazolam (Xanax)	Comprimate 0,5 mg	5 buc	Tulburări de panică-0,5-1 mg alprazolam administrată oral.